| 療法名 | 薬品名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | 施行日 | 1クール | 備考 |
|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---------------------|-----------|------|------------|
| FEC100 | フルオロウラシル | 500mg/m ² | 静注 | 全開 | Day1 | 21日 | |
| | エピルビシン | 100mg/m ² | 静注 | 全開 | | | ※アプレピタント併用 |
| | シクロホスファミド | 500mg/m ² | 静注 | 0.5時間 | | | |
| EC | エピルビシン | 90mg/m² | 静注 | 全開 | -Day1 | 21日 | ※アプレピタント併用 |
| | シクロホスファミド | 600mg/m ² | 静注 | 0.5時間 | | | |
| PTX(weekly) | パクリタキセル | 80mg/m² | 静注 | 1時間 | Day1.8.15 | 28日 | |
| Tmab+PTX | トラスツブマブ | 初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg | 静注 | 1.5時間(2回目 以降短縮可) | Day1 | 7日 | |
| | パクリタキセル | 80mg/ m i | 静注 | 1時間 | Day1 | | |
| Tmab(triweekly) | トラスツブマブ | 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg | 静注 | 1.5時間(2回目 以降短縮可) | Day1 | 21日 | |
| Tmab(weekly) | トラスツブマブ | 初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg | 静注 | 1.5時間(2回目 以降短縮可) | Day1 | 7日 | |
| Bmab+PTX | ベバシズマブ | 10mg/kg | 静注 | | Day1.15 | 28日 | |
| | パクリタキセル | 80mg/m² | 静注 | 1時間 | Day1.8.15 | | |
| Eribulin | エリブリン | 1.4mg/ m ੈ | 静注 | 全開 | Day1.8 | 21日 | |
| GEM | ゲムシタビン | 1250mg/ m i | 静注 | 0.5時間 | Day1.8 | 21日 | |
| nabPTX(triweekly) | パクリタキセル(アルブミン懸濁型) | 260mg/m ² | 静注 | 0.5時間 | Day1 | 21日 | |

令和2年4月1日