

療法名	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	施行日	1クール	備考
mFOLFOX6	レボホリナート	200mg/m ²	静注	2時間(オキサリプラチンと同時)	Day1	14日	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	静注	2時間(レボホリナートと同時)			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	全開			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間持続	Day1~3		
Bmab+mFOLFOX6	ベバシズマブ	5mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)	Day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m ²	静注	2時間(オキサリプラチンと同時)			
	オキサリプラチン	85mg/m ²	静注	2時間(レボホリナートと同時)			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	全開			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間持続	Day1~3		
Pmab+mFOLFOX6	パニツムマブ	6mg/kg	静注	1時間	Day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m ²	静注	2時間(オキサリプラチンと同時)			
	オキサリプラチン	85mg/m ²	静注	2時間(レボホリナートと同時)			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	全開			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間持続	Day1~3		
Cmab+mFOLFOX6	セツキシマブ	初回400mg/m ² (2クール目以降250mg/m ²)	静注	2時間(2クール目以降1時間)	Day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m ²	静注	2時間(オキサリプラチンと同時)			
	オキサリプラチン	85mg/m ²	静注	2時間(レボホリナートと同時)			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	全開			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間持続	Day1~3		
	セツキシマブ	250mg/m ²	静注	1時間	Day8		
FOLFIRI	レボホリナート	200mg/m ²	静注	2時間(イリノテカンと同時)	Day1	14日	
	イリノテカン	150mg/m ²	静注	2時間(レボホリナートと同時)			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	全開			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間持続	Day1~3		
Bmab+FOLFIRI	ベバシズマブ	5mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)	Day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m ²	静注	2時間(イリノテカンと同時)			
	イリノテカン	150mg/m ²	静注	2時間(レボホリナートと同時)			

	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	全開			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間持続	Day1～3		
Pmab+FOLFIRI	パニツムマブ	6mg/kg	静注	1時間	Day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m ²	静注	2時間(イリノテカンと同時)			
	イリノテカン	150mg/m ²	静注	2時間(レボホリナートと同時)			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	全開			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間持続	Day1～3		
Cmab+FOLFIRI	セツキシマブ	初回400mg/m ² (2クール目以降250mg/m ²)	静注	2時間(2クール目以降1時間)	Day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m ²	静注	2時間(イリノテカンと同時)			
	イリノテカン	150mg/m ²	静注	2時間(レボホリナートと同時)			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	全開			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間持続	Day1～3		
	セツキシマブ	250mg/m ²	静注	1時間	Day8		
RAM+FOLFIRI	ラムシルマブ	8mg/kg	静注	1時間	Day1	14日	
	レボホリナート	200mg/m ²	静注	2時間(イリノテカンと同時)			
	イリノテカン	150mg/m ²	静注	2時間(レボホリナートと同時)			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	全開			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	46時間持続	Day1～3		
Bmab+FOLFOXIRI	ベバシズマブ	5mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)	Day1	14日	*適宜減量
	イリノテカン	150mg/m ²	静注	1.5時間			
	レボホリナート	200mg/m ²	静注	2時間(オキサリプラチンと同時)			
	オキサリプラチン	85mg/m ²	静注	2時間(レボホリナートと同時)			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	全開			
	フルオロウラシル	(3200)mg/m ² *	持続静注	48時間持続	Day1～3		
Bmab+CAP	ベバシズマブ	7.5mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)	Day1	21日	
	カベシタビン	1.36m ² 未満 1200mg/回	経口	1日2回	Day1～14		
		1.36m ² 以上～1.66m ² 未満 1500mg/回					
1.66m ² 以上1.96m ² 未満 1800mg/回							

		1.96㎡以上 2100mg/回					
Bmab+FTD/TPI(TAS 102)	ペバシズマブ	5mg/kg	静注	1.5時間(2回目 以降短縮可)	Day1.15	28日	
	トリフルリジン・チピラシ ル塩酸塩配合錠 (ロンサーフ配合錠)	35mg/㎡/回	経口	1日2回	Day1~5. Day8~12		
Bmab+S1	ペバシズマブ	5mg/kg	静注	1.5時間(2回目 以降短縮可)	Day1.15.29	42日	
	テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム配合 (S1)	1.25㎡未満 40mg/回	経口	1日2回	Day1~28		
		1.25㎡以上 1.5㎡未満 50mg/回					
1.5㎡以上 60mg/回							
Bmab+UFT/LV	ペバシズマブ	5mg/kg	静注	1.5時間(2回目 以降短縮可)	Day1.15	28日	
	テガフル・ウラシル配 合 (ユーエフティ)	1.17㎡未満 300mg/日	経口	1日3回(約8時 間ごと) 食事の前後1時 間を避けて	Day1~21		
		1.17㎡以上 1.49㎡未満 400mg/日					
		1.5㎡以上 1.83㎡未満 500mg/日					
		1.84㎡以上 600mg/日					
ホリナート	25mg/回						
CAPOX	オキサリプラチン	130mg/㎡	静注	2時間	Day1	21日	
	カベシタビン	1.36㎡未満 1200mg/回	経口	1日2回	Day1~14		
		1.36㎡以上~1.66㎡未満 1500mg/回					
		1.66㎡以上 1.96㎡未満 1800mg/回					
		1.96㎡以上 2100mg/回					
Bmab+CAPOX	ペバシズマブ	7.5mg/kg	静注	1.5時間(2回目 以降短縮可)	Day1	21日	
	オキサリプラチン	130mg/㎡	静注	2時間			
	カベシタビン	1.36㎡未満 1200mg/回	経口	1日2回	Day1~14		
		1.36㎡以上~1.66㎡未満 1500mg/回					
		1.66㎡以上 1.96㎡未満 1800mg/回					
1.96㎡以上 2100mg/回							
SOX	オキサリプラチン	130mg/㎡	静注	2時間	Day1	21日	
	テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム配合 (S1)	1.25㎡未満 40mg/回	経口	1日2回	Day1~14		
		1.25㎡以上 1.5㎡未満 50mg/回					
		1.5㎡以上 60mg/回					

Bmab+SOX	ベバシズマブ	7.5mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)	Day1	21日	
	オキサリプラチン	130mg/m ²	静注	2時間			
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(S1)	1.25m ² 未満 40mg/回	経口	1日2回	Day1~14		
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満 50mg/回							
1.5m ² 以上 60mg/回							
IRIS	イリノテカン	125mg/m ²	静注	1.5時間	Day1.15	28日	
	テガフル・ギメラシル・オ	1.25m ² 未満 40mg/回	経口	1日2回	Day1~14		
		1.25m ² 以上 1.5m ² 未満 50mg/回					
1.5m ² 以上 60mg/回							
Bmab+IRIS	ベバシズマブ	5mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)	Day1.15	28日	
	イリノテカン	125mg/m ²	静注	1.5時間			
	テガフル・ギメラシル・オ	1.25m ² 未満 40mg/回	経口	1日2回	Day1~14		
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満 50mg/回							
1.5m ² 以上 60mg/回							
Bmab	ベバシズマブ	5mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)	Day1	14日	
Pmab	パニツムマブ	6mg/kg	静注	1時間	Day1	14日	
Cmab(weekly)	セツキシマブ	初回400mg /m ² (2回目以降250mg/m ²)	静注	2時間(2回目以降1時間)	Day1	7日	
Cmab(biweekly)	セツキシマブ	500mg /m ²	静注	2時間	Day1	14日	
CPT11	イリノテカン	150mg/m ²	静注	1.5時間	Day1	14日	

令和2年4月1日