

膵癌・胆道癌

療法名	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	施行日	1クール	備考
GEM 膵・胆道癌	ゲムシタビン	1000mg/m ²	静注	0.5時間	Day1.8.15	28日	
GEM+CDDP(GC) 胆道癌	ゲムシタビン	1000mg/m ²	静注	0.5時間	Day1.8	21日	
	シスプラチン	25mg/m ²	静注	1時間	Day1.8		
nabPTX+GEM 膵癌	ゲムシタビン	1000mg/m ²	静注	0.5時間	Day1.8.15	28日	
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125mg/m ²	静注	0.5時間	Day1.8.15		
mFOLFIRINOX 膵癌	オキサリプラチン	85mg/m ²	静注	2時間	Day1	14日	※アプレピタント併用
	レボホリナート	200mg/m ²	静注	2時間(イリノテカンと同時)			
	イリノテカン	150mg/m ²	静注	2時間(レボホリナートと同時)			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	静注	46時間持続	Day1～3		
GEM+S1(GS) 膵・胆道癌	ゲムシタビン	1000mg/m ²	静注	0.5時間	Day1.8	21(～28)日	
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(S1)	1.25m ² 未満 40mg/回	経口	1日2回	Day1～14		
		1.25m ² 以上 1.5m ² 未満 50mg/回					
1.5m ² 以上 60mg/回							

令和2年4月1日