

膵癌・胆道・肝細胞癌

療法名	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	施行日	1クール	備考
GEM 膵・胆道癌	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	静注	0.5時間	Day1.8.15	28日	
GEM+CDDP(GC) 胆道癌	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	静注	0.5時間	Day1.8	21日	
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	静注	1時間	Day1.8		
nabPTX+GEM 膵癌	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	静注	0.5時間	Day1.8.15	28日	
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125mg/m <sup>2</sup>	静注	0.5時間	Day1.8.15		
mFOLFIRINOX 膵癌	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	静注	2時間	Day1	14日	※アプレピタント併用
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	静注	2時間(イリノテカンと同時)			
	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	静注	2時間(レボホリナートと同時)			
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	静注	46時間持続	Day1~3		
GEM+S1(GS) 膵・胆道癌	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	静注	0.5時間	Day1.8	21(~28)日	
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(S1)	1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回	経口	1日2回	Day1~14		
		1.25m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回					
1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回							
nalIRI(Onivyde) +5FU/QLV 膵癌	イリノテカンリポソーム	70mg/m <sup>2</sup> UGT1A1*6若しくは1A1*28のホモ接合体を有する患者、又は1A1*6及び1A1*28のヘテロ接合体を有する患者では、イリノテカンとして1回50mg/m <sup>2</sup> を開始用量とする	静注	1.5時間	Day1	14日	※アプレピタント併用
		レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	静注			
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	静注	46時間持続	Day1~3		
Atezolizumab(TECENTRIQ)+Bmab 肝細胞癌	アテゾリズマブ	1200mg/body	静注	1時間(2回目以降短縮可)	Day1	21日	
	ベバシズマブ	15mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)			
RAM 肝細胞癌	ラムシルマブ	8mg/kg	静注	1時間(2回目以降短縮可)	Day1	14日	

令和4年9月1日