

療法名	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	施行日	1クール	備考
TC(triweekly) 子宮体癌・卵巣癌 ・子宮頸癌	パクリタキセル	175mg/m ²	静注	3時間	Day1	21日	※アプレピタント併用
	カルボプラチン	AUC6	静注	1時間			
TC(weekly) 子宮体癌・卵巣癌	パクリタキセル	60mg/m ²	静注	1.5時間	Day1.8.15	28日	
	カルボプラチン	AUC2	静注	1時間			
AP 子宮体癌	ドキソルビシン	60mg/m ²	静注	全開	Day1	21日	※アプレピタント併用
	シスプラチン	50mg/m ²	静注	2時間			
DC 子宮体癌・卵巣癌	ドセタキセル	75mg/kg	静注	1時間	Day1	21日	※アプレピタント併用
	カルボプラチン	AUC6	静注	1時間			
TC(triweekly)+Bmab 卵巣癌	パクリタキセル	175mg/m ²	静注	3時間	Day1	21日	※アプレピタント併用
	カルボプラチン	AUC6	静注	1時間			
	ベバシズマブ	15mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)			
Bmab(triweekly) 卵巣癌	ベバシズマブ	15mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)	Day1	21日	
PLD 卵巣癌	リポソーマル ドキソルビシン	50mg/m ²	静注	1.5時間 (1mg/1minを超えないこと)	Day1	28日	
TP 子宮頸癌	パクリタキセル	175mg/m ²	静注	3時間	Day1	21日	※アプレピタント併用
	シスプラチン	50mg/m ²	静注	2時間			
TP+Bmab 子宮頸癌	パクリタキセル	175mg/m ²	静注	3時間	Day1	21日	※アプレピタント併用
	シスプラチン	50mg/m ²	静注	2時間			
	ベバシズマブ	15mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)			
GEM 卵巣癌	ゲムシタビン	1000mg/m ²	静注	0.5時間	Day1.8.15	28日	
NGT 卵巣癌	ノギテカン	1.25~1.5mg/m ²	静注	0.5時間	Day1.2.3.4.5	21日	
CBDCA 卵巣癌	カルボプラチン	AUC6	静注	1時間	Day1	21日	※アプレピタント併用