

## 泌尿器科癌

| 療法名                            | 薬品名      | 投与量                   | 投与経路 | 投与時間  | 施行日        | 1クール | 備考         |
|--------------------------------|----------|-----------------------|------|-------|------------|------|------------|
| GEM+CDDP(GC)<br>4week<br>尿路上皮癌 | ゲムシタビン   | 1000mg/m <sup>2</sup> | 静注   | 0.5時間 | Day1.8.15  | 28日  | ※アプレピタント併用 |
|                                | シスプラチン   | 70mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 2時間   | Day2       |      |            |
| GEM+CDDP(GC)<br>3week<br>尿路上皮癌 | ゲムシタビン   | 1000mg/m <sup>2</sup> | 静注   | 0.5時間 | Day1.8     | 21日  | ※アプレピタント併用 |
|                                | シスプラチン   | 70mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 2時間   | Day2       |      |            |
| GEM+CBDCA<br>尿路上皮癌             | ゲムシタビン   | 1000mg/m <sup>2</sup> | 静注   | 0.5時間 | Day1       | 28日  | ※腎機能障害時    |
|                                | カルボプラチン  | AUC5                  | 静注   | 1時間   | Day2       |      |            |
| M-VAC<br>尿路上皮癌                 | メソトレキサート | 30mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 1時間   | Day1.15.22 | 28日  | ※アプレピタント併用 |
|                                | ビンブラスチン  | 3mg/m <sup>2</sup>    | 静注   | 全開    | Day2.15.22 |      |            |
|                                | ドキシソルビシン | 30mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 0.5時間 | Day2       |      |            |
|                                | シスプラチン   | 70mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 2時間   | Day2       |      |            |
| HRPC/DTX<br>前立腺癌               | ドセタキセル   | 75mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 1時間   | Day1       | 21日  |            |
| Cabazitaxel<br>前立腺癌            | カバジタキセル  | 25mg/m <sup>2</sup>   | 静注   | 1時間   | Day1       | 21日  | ※プレドニゾン併用  |
| Nivolumab<br>腎細胞癌              | ニボルマブ    | 240mg/body            | 静注   | 1時間   | Day1       | 14日  |            |
| Pembrolizumab<br>尿路上皮癌         | ペムブロリズマブ | 200mg/body            | 静注   | 0.5時間 | Day1       | 21日  |            |

令和4年9月1日