

療法名	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	施行日	1クール	備考
S1+CDDP(SP)	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	静注	2時間	Day8	35日	※アプレピタント併用
	テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合 (S1)	1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回	経口	1日2回	Day1~21		
CAPOX	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	静注	2時間	Day1	21日	
	カペシタビン	1.36m <sup>2</sup> 未満 1200mg/回 1.36m <sup>2</sup> 以上~1.66m <sup>2</sup> 未満 1500mg/回 1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満 1800mg/回 1.96m <sup>2</sup> 以上 2100mg/回	経口	1日2回	Day1~14		
SOX(OX100mg/m <sup>2</sup> )	オキサリプラチン	100mg/m <sup>2</sup>	静注	2時間	Day1	21日	
	テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合 (S1)	1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回	経口	1日2回	Day1~14		
DTX+S1	ドセタキセル	40mg/m <sup>2</sup>	静注	1時間	Day1	21日	
	テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合 (S1)	1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回	経口	1日2回	Day1~14		
CAP+CDDP(XP)	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	静注	2時間	Day1	21日	※アプレピタント併用
	カペシタビン	1.36m <sup>2</sup> 未満 1200mg/回 1.36m <sup>2</sup> 以上~1.66m <sup>2</sup> 未満 1500mg/回 1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満 1800mg/回 1.96m <sup>2</sup> 以上 2100mg/回	経口	1日2回	Day1~14		
Tmab+CAP+CDDP (HXP)	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	静注	1.5時間(2回 目以降短縮 可)	Day1	21日	※アプレピタント併用
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	静注	2時間	Day1		
	カペシタビン	1.36m <sup>2</sup> 未満 1200mg/回 1.36m <sup>2</sup> 以上~1.66m <sup>2</sup> 未満 1500mg/回 1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満 1800mg/回	経口	1日2回	Day1~14		

		1.96㎡以上 2100mg/回					
RAM+PTX	ラムシルマブ	8mg/kg	静注	1時間	Day1.15	28日	
	パクリタキセル	80mg/㎡	静注	1時間	Day1.8.15		
RAM+nabPTX	ラムシルマブ	8mg/kg	静注	1時間	Day1.15	28日	
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg/㎡	静注	0.5時間	Day1.8.15		
PTX(weekly)	パクリタキセル	80mg/㎡	静注	1時間	Day1.8.15	28日	
nabPTX(triweekly)	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	260mg/㎡	静注	0.5時間	Day1	21日	
CPT11	イリノテカン	150mg/㎡	静注	1.5時間	Day1	14日	
Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body	静注	0.5時間	Day1	14日	
Tmab+CAPOX	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	静注	1.5時間(2回目以降短縮可)	Day1	21日	
	オキサリプラチン	130mg/㎡	静注	2時間	Day1		
	カペシタビン	1.36㎡未満 1200mg/回 1.36㎡以上～1.66㎡未満 1500mg/回 1.66㎡以上1.96㎡未満 1800mg/回 1.96㎡以上 2100mg/回	経口	1日2回	Day1～14		
Nivolumab+SOX	ニボルマブ	360mg/body	静注	0.5時間	Day1	21日	
	オキサリプラチン	130mg/㎡	静注	2時間			
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(S1)	1.25㎡未満 40mg/回 1.25㎡以上 1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回	経口	1日2回	Day1～14		
Nivolumab+mFOLFOX6	ニボルマブ	240mg/body	静注	0.5時間	Day1	14日	
	レボホリナート	200mg/㎡	静注	2時間(オキサリプラチンと同時)			
	オキサリプラチン	85mg/㎡	静注	2時間(レボホリナートと同時)			
	フルオロウラシル	400mg/㎡	急速静注	全開			
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	持続静注	46時間持続			Day1～3
mFOLFOX6	レボホリナート	200mg/㎡	静注	2時間(オキサリプラチンと同時)	Day1	14日	
	オキサリプラチン	85mg/㎡	静注	2時間(レボホリナートと同時)			
	フルオロウラシル	400mg/㎡	急速静注	全開			

	<u>フルオロウラシル</u>	<u>2400mg/m<sup>2</sup></u>	<u>持続静注</u>	<u>46時間持続</u>	<u>Day1~3</u>		
<u>RAM</u>	<u>ラムシルマブ</u>	<u>8mg/kg</u>	<u>静注</u>	<u>1時間(2回目以降短縮可)</u>	<u>Day1</u>	<u>14日</u>	

令和4年9月1日