療法名	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	施行日	1クール	備考
FEC100	フルオロウラシル	500mg/m ²	点滴静注	全開			
	エピルビシン	100mg/m ²	点滴静注	全開	Day1	21日	※アプレピタント併用 ※ペグフィルグラスチ ム併用
	シクロホスファミド	500mg/m ²	点滴静注	0.5時間			
EC	エピルビシン	90mg/m ²	点滴静注	全開	Day1	21日	※アプレピタント併用 ※ペグフィルグラスチ ム併用
	シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	0.5時間			
PTX(weekly)	パクリタキセル	80mg/m²	点滴静注	1時間	Day1	<u>7日</u>	
Tmab+PTX	トラスツブマブ	初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg	点滴静注	1.5時間(2回目 以降短縮可)	-Day1	7日	
	パクリタキセル	80mg/m²	点滴静注	1時間			
Tmab(triweekly)	トラスツブマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注	1.5時間(2回目 以降短縮可)	Day1	21日	
Tmab(weekly)	トラスツブマブ	初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg	点滴静注	1.5時間(2回目 以降短縮可)	Day1	7日	
Bmab+PTX	ベバシズマブ	10mg/kg	点滴静注	1.5時間(2回目 以降短縮可)	Day1.15	28日	
	パクリタキセル	80~90mg/m ²	点滴静注	1時間			
Eribulin	エリブリン	1.4mg/ m ²	点滴静注	全開	Day1.8	21日	
GEM	ゲムシタビン	1250mg/ m ²	点滴静注	0.5時間	Day1.8	21日	
nabPTX(triweekly)	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	260mg/m ²	点滴静注	0.5時間	Day1	21日	
DTX(triweekly)	ドセタキセル	60∼75mg/m ²	点滴静注	1時間	Day1	21日	
T-DM1	トラスツブマブ エムタンシン	3.6mg/kg	点滴静注	1.5時間(2回目 以降短縮可)	Day1	21日	
PER+HER+DTX	ペルツズマブ	初回840mg/body 2回目以降420mg/body	点滴静注	1時間(2回目以 降短縮可)			
	トラスツブマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注	1.5時間(2回目 以降短縮可)	Day1	21日	
	ドセタキセル	75mg/ m ²	点滴静注	1時間			
PER+HER+PTX	ペルツズマブ	初回840mg/body 2回目以降420mg/body	点滴静注	1時間(2回目以 降短縮可)			
	トラスツブマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注	1.5時間(2回目 以降短縮可)	-Day1	21日	
	パクリタキセル	80mg/ m ²	点滴静注	1.5時間	Day1.8.15		
PER+HER+Eribulin	ペルツズマブ	初回840mg/body 2回目以降420mg/body	点滴静注	1時間(2回目以 降短縮可)	Day1		
	トラスツブマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注	1.5時間(2回目 以降短縮可)	Day1	21日	
	エリブリン	1.4mg/m ²	点滴静注	全開	Day1.8		
PER+HER+VNR	ペルツズマブ	初回840mg/body 2回目以降420mg/body	点滴静注	1時間(2回目以 降短縮可)	Dav1		

	トラスツブマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注	1.5時間(2回目 以降短縮可)	Day I	21日	
	ビノレルビン	25mg/ m [*]	点滴静注	全開(10分以 内)	Day1.8		
Tmab+DTX	トラスツブマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	<u>点滴静注</u>	1.5時間(2回目 以降短縮可)	- <u>Day1</u>	21日	
	ドセタキセル	<u>60∼75mg/m</u> ²	<u>点滴静注</u>	<u>1時間</u>			
dose-dense AC	<u>ドキソルビシン</u>	<u>60mg/m²</u>	<u>点滴静注</u>	<u>全開</u>	- <u>Day1</u>	<u>14日</u>	※アプレピタント併用 ※ペグフィルグラスチ ム併用
	<u>シクロホスファミド</u>	600mg/m ²	<u>点滴静注</u>	<u>0.5時間</u>			
DTX+CPA	<u>ドセタキセル</u>	<u>75mg/m²</u>	<u>点滴静注</u>	<u>1時間</u>	- <u>Day1</u>	<u>21日</u>	※アプレピタント併用 ※ペグフィルグラスチ ム併用
	<u>シクロホスファミド</u>	<u>600mg/m²</u>	<u>点滴静注</u>	<u>0.5時間</u>			
Pembrolizumab	<u>ペムブロリズマブ</u>	200mg/body	<u>点滴静注</u>	<u>0.5時間</u>	<u>Day1</u>		
+GEM+CBDCA	<u>ゲムシタビン</u>	<u>1000mg/m²</u>	<u>点滴静注</u>	<u>0.5時間</u>	-Day1.8	21日	
	<u>カルボプラチン</u>	AUC2	<u>点滴静注</u>	<u>1時間</u>	<u>Day 1.0</u>		
Pembrolizumab +CBDCA+PTX	<u>ペムブロリズマブ</u>	200mg/body	<u>点滴静注</u>	<u>0.5時間</u>	<u>Dav1</u> - <u>Dav1.8.15</u>	21日	
	パクリタキセル	<u>80mg/m²</u>	<u>点滴静注</u>	<u>1時間</u>			
	<u>カルボプラチン</u>	<u>AUC1.5</u>	<u>点滴静注</u>	<u>1時間</u>			
	<u>ペムブロリズマブ</u>	200mg/body	<u>点滴静注</u>	<u>0.5時間</u>			
Pembrolizumab +EC	エピルビシン	<u>90mg/m²</u>	<u>点滴静注</u>	<u>全開</u>	Day1	21日	<u>※アプレピタント併用</u> <u>※ペグフィルグラスチ</u> <u>ム併用</u>
	<u>シクロホスファミド</u>	<u>600mg/m²</u>	<u>点滴静注</u>	<u>0.5時間</u>			
Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200mg/body	<u>点滴静注</u>	<u>0.5時間</u>	Day1	<u>21日</u>	
Atezolizumab +nabPTX	<u>アテゾリズマブ</u>	840mg/body	<u>点滴静注</u>	<u>1時間</u>	<u>Day1.15</u>	28日	
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	<u>100mg/m²</u>	<u>点滴静注</u>	0.5時間	<u>Day1.8.15</u>	<u> 2011</u>	
Sacituzumab Govitecan	サシツズマブ ゴビテカン	10mg/kg	<u>点滴静注</u>	3時間(2回目以 降短縮可)	<u>Day1.8</u>	<u>21日</u>	

令和7年9月1日