

膵癌・胆道・肝細胞癌

*肝細胞癌								
療法名	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	施行日	1クール	備考	
GEM 膵・胆道癌	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	0.5時間	Day1.8.15	28日		
GEM+CDDP(GC) 胆道癌	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	0.5時間	Day1.8	21日		
	シスプラチン	25mg/㎡	点滴静注	1時間	Day1.8			
nabPTX+GEM 膵癌	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	0.5時間	Day1.8.15	28日		
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125mg/㎡	点滴静注	0.5時間	Day1.8.15			
mFOLFIRINOX 膵癌	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	2時間	Day1	14日	※アプレピタント併用	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間(イリノテカンと同時)				
	イリノテカン	150mg/㎡	点滴静注	2時間(レボホリナートと同時)				
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間持続	Day1～3			
GEM+S1(GS) 膵癌	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	0.5時間	Day1.8	21日		
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(S1)	C法	経口	1日2回	Day1～14			
GEM+S1(GS) 胆道癌	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	0.5時間	Day1.8	21日		
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(S1)	F法	経口	1日2回	Day1～14			
GEM+CDDP+S1(GCS) 胆道癌	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	0.5時間	Day1	14日		
	シスプラチン	25mg/㎡	点滴静注	1時間	Day1			
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(S1)	E法	経口	1日2回	Day1～7			
nalIRI(Onivyde)+5FU/QLV 膵癌	イリノテカンリポソーム	70mg/㎡ UGT1A1＊6若しくは1A1＊28のホモ接合体を有する患者、又は1A1＊6及び1A1＊28のヘテロ接合体を有する患者では、イリノテカンとして1回50mg/㎡2を開始用量とする	点滴静注	1.5時間	Day1	14日	※アプレピタント併用	
	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	2時間				
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間持続	Day1～3			
Atezolizumab(TECENTRIQ)+Bmab 肝細胞癌	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注	1時間(2回目以降短縮可)	Day1	21日		
	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	1.5時間(2回目以降短縮可)				
RAM 肝細胞癌	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	1時間(2回目以降短縮可)	Day1	14日		
Tremelimumab(IMJUDO)+Durvalumab(IMFINZI) 肝細胞癌	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	300mg/body(体重30kg以下の場合は4mg/kg)	点滴静注	1時間	Day1※	28日	※トレメリムマブは初回のみ	
	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	1500mg/body(体重30kg以下の場合は20mg/kg)	点滴静注	1時間	Day1			
Durvalumab(IMFINZI)+GEM+CDDP(GC)	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	1500mg/body(体重30kg以下の場合は20mg/kg)	点滴静注	1時間	Day1	21日		
	ゲムシタビン	1000mg/㎡	点滴静注	0.5時間	Day1.8			

胆道癌	シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注	1時間	Day1.8		
Durvalumab(IMFINZI) 胆道・肝細胞癌	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	1500mg/body(体重30kg以下の場合は20mg/kg)	点滴静注	1時間	Day1	28日	
Pembrolizumab+GEM +CDDP(GC)	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	200mg/body	点滴静注	0.5時間	Day1	21日	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	0.5時間	Day1.8		
胆道癌	シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注	1時間	Day1.8		
Pembrolizumab+GEM	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	200mg/body	点滴静注	0.5時間	Day1	21日	
胆道癌	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	0.5時間	Day1.8		

令和7年9月1日